



matholding group

Puntos fuertes

1. Tiene un efecto preventivo, curativo y erradicante.
2. Su modo de acción es único, lo que le da una dificultad de que aparezcan resistencias.
3. Actúa sobre cualquier forma del hongo y sobre cualquier tejido de la planta: brotes, hojas, flores y frutos.
4. Posee una gran capacidad de penetración en la planta desplazándose de forma translaminar.
5. Es compatible con los insectos auxiliares y polinizadores.
6. Es absorbido pasada una hora del tratamiento, lo que le confiere una fuerte resistencia al lavado por la lluvia.
7. Puede aplicarse en superficie mojada y en condiciones de baja temperatura.

Características generales

Efuzin® es un fungicida foliar con actividad preventiva, curativa y erradicante. No es sistémico por naturaleza, pero posee cierta actividad translaminar que permite su difusión dentro de las diferentes partes del árbol. Actúa colapsando el estrato lipídico de la membrana del patógeno provocando la consiguiente deshidratación de la célula y por último, la muerte del hongo.

- **Uso del producto:** Fungicida penetrante de acción multisitio.
- **Composición:** Dodina 40%
- **Formulación:** SC (Concentrado Soluble)
- **Número de registro:** 23.392
- **Familia química:** Guanidinas (Grupo FRAC M7)
- **Modo de acción:** Aplicar en pulverización normal de forma preventiva en fases tempranas del cultivo (ver tabla) respetando el plazo de seguridad de **cara a la segunda aplicación.**
- **Presentación:** 1L y 5L



matholding group

IQV Agro España

EFUZIN®

PROTECCIÓN INTEGRAL EN FRUTALES Y OLIVAR

Condiciones de almacenaje

A.- Medidas técnicas de almacenamiento

- ITC (R.D.379/2001): No relevante
- Clasificación: No relevante
- Temperatura mínima: 5 °C
- Temperatura máxima: 30 °C
- Tiempo máximo: 24 meses

B.- Condiciones generales de almacenamiento

- Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.



Condiciones de uso

Generales:

Aplicar en pulverización normal con tractor, lanza, pistola o mochila. Y, preferiblemente, de forma preventiva. La primera aplicación puede dosificarse al 0,16-0,20% para acción curativa, dentro de las 48 horas desde el comienzo de la infección.

Específicos:

Cerezo

- Desde BBCH 60 (apertura de la flor).
- Hasta 14 días antes de la cosecha (BBCH 79 “frutos alcanzan alrededor del 90% del tamaño varietal final”).
- Para tratamientos curativos, usar dentro de las 24 horas desde el comienzo de la infección, en caso de temperaturas frías.

Frutales de hueso

(melocotonero, nectarino y similar)

- Desde BBCH 01 (hinchado de las yemas foliares).
- Hasta BBCH 69 (caída de los pétalos) y/o después desde la caída del 50% de las hojas hasta la caída total de las hojas (otoño).

Manzano

- Desde BBCH 01 (hinchado de yemas).
- Hasta 60 días antes de cosecha.
- Para un buen control de moteado, preferiblemente, aplicar en los dos primeros tratamientos del programa preventivo de fungicidas. Para tratamientos curativos, usar dentro de las 24 horas desde el comienzo de la infección, en caso de temperaturas frías.
- En Golden Delicious puede aparecer russetting, si se trata después de estado fenológico de botón rosa, también puede aparecer russetting en manzanas Grimes, Golden y Rhode Island.
- Si el tiempo es frío (por debajo de 5°C) o en condiciones ligeramente secas, no tratar manzanos durante la floración o inmediatamente después de la caída de los pétalos.
- No aplicar en manzana de sidra.

Usos autorizados por cultivo y/o patógeno

CULTIVO	PATÓGENO	DOSIS %	DOSIS L/ha	CALDO L/ha	Nº APLICA.	INTERVALO APLICA.	P.S.
Cerezo	Gnomonia	0,16% - 0,20%	1,7 L/ha	500-1.000	2	7	14
Frutales de hueso	Abolladura, Antracnosis, Cribado, Moteado			200-1.000			75
Frutales de pepita	Antracnosis, Moteado						60
Níspero	Antracnosis, Negrón		1,7-2,25 L/ha				NP
Olivo	Repilo						



Membrillero, Níspero y Níspero del Japón

- Desde BBCH 01 (hinchado de yemas)
- Hasta 60 días antes de cosecha.
- Preferiblemente, aplicar en los dos primeros tratamientos del programa preventivo de fungicidas para control de moteado.
- Para tratamientos curativos, usar dentro de las 24 horas desde el comienzo de la infección en caso de temperaturas frías.

Olivo

- Desde BBCH 11 (los brotes alcanzan el 10% de su tamaño final)
- Hasta BBCH 69 (fin de la floración) y/o en otoño.

Peral

- Desde BBCH 01 (hinchado de yemas) hasta 60 días antes de cosecha.
- Preferiblemente, aplicar en los dos primeros tratamientos del programa preventivo de fungicidas para control de moteado.
- Para tratamientos curativos, usar dentro de las 24 horas desde el comienzo de la infección en caso de temperaturas frías.
- No aplicar en peral variedad Conference.
- Si el tiempo es frío (por debajo de 5°C) o en condiciones ligeramente secas, no tratar perales durante la floración o inmediatamente después de la caída de los pétalos.